

Временные противопоказания

Наименование	Срок отвода от донорства
<i>Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями</i>	
Трансфузии крови, ее компонентов (исключение составляют ожоговые реконвалесценты и лица, иммунизированные к резус-фактору)	6 мес
Оперативные вмешательства, в том числе аборты (необходимо представление медицинской справки (выписки из истории болезни) о характере и дате операции)	6 мес со дня оперативного вмешательства
Нанесение татуировки или лечение иглоукалыванием	1 год с момента окончания процедур
Пребывание в заграничных командировках длительностью более 2	6 мес

мес	
Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) более 3 мес	3 года
Контакт с больными гепатитами: - гепатит А - гепатиты В и С	3 мес 1 год
<i>Перенесенные заболевания</i>	
<i>Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные противопоказания»</i>	
Малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатах иммунологических тестов	3 года
Брюшной тиф после выздоровления и полного клинического	1 год

обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств	
Ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция	1 мес после выздоровления
Прочие инфекционные заболевания, не указанные выше и в разделе «Абсолютные противопоказания»	6 мес после выздоровления
Экстракция зуба	10 дней
Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации	1 мес
Вегетососудистая дистония	1 мес
Аллергические заболевания в стадии обострения	2 мес после купирования острого периода
<i>Другие причины</i>	

Период беременности и лактации	1 год после родов, 3 мес после окончания лактации
Период менструации	5 дней со дня окончания менструации
Прием алкоголя	48 ч
<i>Прививки</i>	
Прививка инактивированными вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами	10 дней
Прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полиомиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений в месте инъекции)	1 мес
Введение иммуноглобулина против	1 год

гепатита В	
Прививка вакциной против бешенства	2 нед
<i>Прием лекарственных препаратов</i>	
Антибиотики	2 нед после окончания приема
Анальгетики, салицилаты	3 дня после окончания приема
<i>Изменения биохимических показателей крови</i>	
Повышение активности аланинаминотрансферазы менее чем в 2 раза	3 мес
Повторное повышение активности аланинаминотрансферазы в 2 раз и более	отстранение от донорства и направление на обследование
Диспротеинемия	1 мес

Примечание. При наличии у донора заболеваний, не вошедших в данный перечень, вопрос о допуске к донорству решается комиссионно врачом-трансфузиологом и соответствующим(ими) специалистом(ами).